

1 Quadrieren / Wurzelziehen

2 $\sqrt{2}$ ist eine reelle Zahl

3 Teilweise Wurzelziehen

4 Wurzeln multiplizieren & dividieren

5 Wurzeln addieren & subtrahieren

6 kürzen & erweitern



$$a\sqrt{x} + b\sqrt{x} = (a+b)\cdot\sqrt{x}$$
$$\sqrt{72} + \sqrt{50} = 6\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 11\sqrt{2}$$



$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$$



$$\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a : b}$$
$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$



$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$$



Quadrieren / Wurzelziehen

Wurzelziehen ist die Umkehrung vom Quadrieren.

QUADRIEREN

$x \rightarrow x^2$

WURZELZIEHEN

QUADRIEREN

x	x ²
5	5 ² = 25
1	1 ² = 1
9	9 ² = 81
-4	(-4) ² = 16

QUADRATZAHL

WURZELZIEHEN

x ²	x
36	$\sqrt{36} = 6$
1	$\sqrt{1} = 1$
9	$\sqrt{9} = 3$
-4	$\sqrt{-4}$ ⚡

WURZEL



Definition

Die Wurzel aus 36 ist 6, da 6 diejenige **positive** Zahl ist, die mit sich selbst multipliziert 36 ergibt.

$\sqrt{36} = 6$
Radikant

Merke

Die Wurzel aus einer Zahl ist immer positiv.
Man kann nur aus einer positiven Zahl die Wurzel ziehen.

2 $\sqrt{2}$ ist eine reelle Zahl

Beweis nach Euklid

Annahme: $\sqrt{2}$ ist eine rationale Zahl

► Für $\sqrt{2}$ gibt es einen gekürzten Bruch

► $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ p und q sind teilerfremd

► $(\sqrt{2})^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2$

► $2 = \frac{p^2}{q^2} = \frac{p \cdot p}{q \cdot q}$ ⚡ WIDERSPRUCH

Dieser Bruch kann nicht 2 sein, weil p und q teilerfremd sind und durchs Quadrieren kein Teiler hinzukommen kann.

Um 2 zu bekommen, muss aber der Bruch kürzbar sein, z.B. $\frac{20}{10}$

► $\sqrt{2}$ ist **keine rationale Zahl**

Die reellen Zahlen

$$\sqrt{2} = 1,414213562\dots$$

- ist eine **irrationale** Zahl
- hat unendlich viele Nachkommastellen und keine Periode
- kann nur mithilfe einer Intervallschachtelung eingegrenzt werden
[1,414 < $\sqrt{2}$ < 1,415] Intervall 0,001



Rezept

teilweise Wurzelziehen

Steht unter der Wurzel ein quadratischer Faktor, so kann man diesen nach Wurzelziehen vor die Wurzel bringen.

- Zerlege in quadr. Faktoren

$$\sqrt{108} = \sqrt{9 \cdot 12} = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3}$$

- Ziehe die Wurzel

$$\sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3} = 3 \cdot 2 \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$$

- Beispiel 1

$$\sqrt{18 \cdot a^5} = \sqrt{9 \cdot 2 \cdot a^4 \cdot a} = 3 \cdot a^2 \sqrt{2 \cdot a}$$

- Beispiel 2

$$\sqrt{27 \cdot x^6} = \sqrt{9 \cdot 3 \cdot x^6} = 3 \cdot x^3 \sqrt{3}$$

als 1 Term schreiben

Steht vor der Wurzel ein Faktor, so kann man diesen durch Quadrieren unter die Wurzel schreiben.

- Quadriere den Faktor und schreibe unter die Wurzel

$$4\sqrt{3} = \sqrt{4 \cdot 4 \cdot 3}$$

- multipliziere die Faktoren


$$\sqrt{4 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{16 \cdot 3} = \sqrt{48}$$

- Beispiel 1

$$2 \cdot a \sqrt{5a} = \sqrt{2 \cdot 2 \cdot a \cdot a \cdot 5a} = \sqrt{20 \cdot a^3}$$

- Beispiel 2

$$4 \cdot x^3 \sqrt{2x} = \sqrt{16 \cdot x^6 \cdot 2x} = \sqrt{32x^7}$$



Multiplikation

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$$

Werden Wurzeln multipliziert, so kann man sie als Faktoren unter einer Wurzel schreiben und dann multiplizieren.

Beispiele

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{2 \cdot 18} = \sqrt{36} = 6$$

$$\sqrt{3x} \cdot \sqrt{6x^2} = \sqrt{3x \cdot 6x^2} = \sqrt{18x^3}$$

Division

$$\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a:b} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

Werden Wurzeln dividiert, so kann man sie als Bruch unter einer Wurzel schreiben.

Beispiele

$$\sqrt{75} : \sqrt{3} = \sqrt{75:3} = \sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{\frac{14}{30}} : \sqrt{\frac{35}{12}} = \sqrt{\frac{14 \cdot 35}{30 \cdot 12}} = \sqrt{\frac{7 \cdot 7}{6 \cdot 6}} = \frac{7}{6}$$



gaanz wichtig

Diese Regel gilt nicht für \oplus und \ominus !!

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 \neq \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$




Wurzeln addieren & subtrahieren

Addition/Subtraktion

$$\oplus \quad a \cdot \sqrt{x} + b \cdot \sqrt{x} = (a+b) \cdot \sqrt{x} \quad \ominus$$

Man kann nur gleiche Wurzeln addieren/subtrahieren.

Durch Ausklammern kann die Anzahl der gleichen Wurzeln bestimmt werden.



Beispiele

Distributivgesetz

$$\sqrt{2} \cdot (\sqrt{8} + \sqrt{7}) = \sqrt{2 \cdot 8} + \sqrt{2 \cdot 7} = 4 + \sqrt{14}$$

teilweise Wurzelziehen

$$\begin{aligned} \sqrt{72} + \sqrt{12} - \sqrt{50} &= \\ 6 \cdot \sqrt{2} + 2 \cdot \sqrt{3} - 5 \cdot \sqrt{2} &= \sqrt{2} + 2 \cdot \sqrt{3} \end{aligned}$$

↑ ↑ ↑
gleich

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \text{gleich} & & & \\ & \swarrow & & \downarrow & & \searrow & \\ 2\sqrt{3} + \sqrt{5} & & -4\sqrt{3} + \sqrt{5} & = & -2\sqrt{3} + \sqrt{5} \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \\ & & \text{gleich} & & \text{gleich} & & \end{array}$$

Zähle nur gleiche Wurzeln zusammen!



Wurzeln kürzen

Einen Bruch zu kürzen heißt, den **Zähler und Nenner** durch die gleiche Zahl zu **dividieren**.

$$\frac{12}{18} \stackrel{6}{=} \frac{12:6}{18:6} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3} + \sqrt{12}}{\sqrt{6}} &= \frac{\sqrt{3} + \sqrt{3 \cdot 4}}{\sqrt{3 \cdot 2}} = \\ &= \frac{\sqrt{3} \cdot (1 + \sqrt{4})}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}} \stackrel{\sqrt{3}}{=} \frac{1 + 2}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Wurzeln erweitern

Einen Bruch zu erweitern heißt, den **Zähler und Nenner** mit der gleichen Zahl zu **multiplizieren**.

$$\frac{3}{5} \stackrel{6}{=} \frac{3 \cdot 6}{5 \cdot 6} = \frac{18}{30}$$

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{8}} &\stackrel{\sqrt{2}}{=} \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}} = \\ &= \frac{\sqrt{2 \cdot 2} + \sqrt{3 \cdot 2}}{\sqrt{8 \cdot 2}} = \frac{2 + \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

Nenner rational machen

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{10}}{\sqrt{5}} \stackrel{\sqrt{5}}{=} \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{10}) \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2 \cdot 5} + \sqrt{10 \cdot 5}}{\sqrt{5 \cdot 5}} = \frac{\sqrt{10} + 5\sqrt{2}}{5}$$

